

Подготовка к УЗИ желудка и 12-перстной кишки

УЗИ желудка и 12-перстной кишки с водно-сифонной пробой

– это наиболее простой способ исследования, применяемый для первичной диагностики заболеваний и патологии желудка, а также, при наличии противопоказаний к ФГДС и у маленьких детей. Во время исследования оценивается желудок, пищевод, 12-перстная кишка и выполняется водно-сифонная проба.

Показания к УЗИ желудка с водно-сифонной пробой

- боли в верхнем отделе живота
- частая изжога и отрыжка
- обильное срыгивание у детей грудного возраста
- острый и хронический гастрит
- язвенная болезнь желудка
- колиты и запоры
- оценка моторной функции желудка
- подозрение на наличие полипов желудка
- диагностика пилоростеноза и пилороспазма у грудных детей
- диагностика ГЭРБ и недостаточности кардиального сфинктера и др.

Как проводится УЗИ желудка и 12-перстной кишки с водно-сифонной пробой

УЗИ желудка выполняется в два этапа: на пустой желудок и после его наполнения.

Во время УЗИ желудка врач оценивает форму желудка и его положение, толщину стенок желудка в различных отделах, наличие / отсутствие деформаций, количество жидкости в желудке. Также, УЗИ желудка позволяет выявить наружный рост новообразования, в случае, когда оно растет не в полость желудка. Большое значение при выполнении УЗИ желудка имеет оценка перистальтики и скорости эвакуации жидкости (моторная функция). Для этого будет необходимо выпить до 1 литра воды.

Подготовка к УЗИ желудка и 12-перстной кишки с водно-сифонной пробой

- 1 За 2 дня до УЗИ желудка необходимо исключить из рациона продукты, провоцирующие газообразование: черный хлеб, молоко в свежем виде, горох, фасоль, капусту, свежие фрукты, мучные и сладкие блюда, газированные напитки
- 2 Ужин накануне исследования не позднее 8 часов вечера
- 3 В день исследования не есть и не пить, желателно воздержаться от курения
- 4 Взять с собой 1 литр кипяченой воды (бутылка с трубкой)

УЗИ желудка детям

В клиниках EMS УЗИ желудка и 12-перстной кишки выполняется детям с 3 лет натощак. С собой необходимо взять 200–400 мл воды или сок/компот, если ребёнок плохо пьёт воду.