

Как подготовиться к проведению ФГДС (ВЭГДС) и ФКС (ВКС) с анестезией

Эндоскопическое исследование проводится строго натощак.

За 3-4 часа не пить!

Не стоит прекращать прием назначенных ранее лекарственных средств для понижения давления (гипотензивные препараты) ни накануне, ни утром в день исследования. Запейте их 1 глотком воды, но не менее чем за 2 часа до исследования.



Диета, которой нужно придерживаться за 3 дня до проведения исследования

Исключить из рациона: алкоголь, фрукты и овощи в любом виде, хлеб, булка, сдобные хлебобулочные изделия, макаронные изделия, отруби, все злаки и каши.

Разрешается: молочные и кисломолочные продукты (в том числе йогурты и творожки без добавок, сыры), мясо курицы или индейки, яйца (отварные, омлет), отварная рыба, чай (зелёный, чёрный, травяной), прозрачные соки без мякоти и компоты.

Накануне:

Утром до 11:00 легкий завтрак из разрешенных продуктов.

После 11:00 не употреблять пищу!

С 11:00 до 24:00 можно пить только чай (черный, зеленый, травяной можно сладкий), воду, светлые прозрачные соки без мякоти и компоты.

Препаратом выбора является Фортранс. Препарат Эзиклен применять для подготовки при наличии противопоказаний к Фортрансу.



Схема приема препарата Фортранс

принимается по рекомендации лечащего врача

Накануне:

- С 15:00 до 23:00 принять раствор Фортранс (3 пакетика на 3 л воды). Препарат нельзя принимать быстро. Необходимо растянуть прием 3 литров препарата равномерно на 6 часов. Чтобы легче переносить вкус Фортранса, можно добавить сок без мякоти или компот.

В день исследования:

- С 05:00 до 06:00 утра равномерно принять последний четвертый раствор Фортранс (1 пакетик на 1 л воды).



Схема приема препарата Эзиклен

принимается по рекомендации лечащего врача

Накануне:

- Вечером накануне исследования пакет Эзиклена развести на 1 литр воды и выпить раствор, после чего выпить еще 0.5 литра чистой воды.

В день исследования:

- Второй пакет Эзиклена необходимо по той же схеме выпить в 4-5 утра в день исследования

Параллельно, до и после принятия препарата можно пить воду, чай зеленый, прозрачные соки без мякоти, компоты до 24:00.



Рекомендации при сопутствующих заболеваниях

В дни подготовки к колоноскопии возможен, и даже нужен, приём необходимых лекарств за исключением препаратов железа и сорбентов (активированный уголь, Полисорб, Энтеросгель, Смекта и т.д.).

- При хронических запорах рекомендации по питанию нужно соблюдать в течение 5 дней. За 3-5 дней до обследования начать или продолжить прием слабительных препаратов по рекомендации врача-гастроэнтеролога.
- Препараты железа рекомендуется отменить за 3 дня до проведения обследования.
- Прием жизненно важных лекарств (нормализующих давление, сердечный ритм, гормональных, гипогликемических и др.) необходимо закончить за 1 час до начала исследования.
- Перед проведением данного исследования у больных сахарным диабетом для корректировки диеты при подготовке необходима консультация врача-эндокринолога. Непосредственно перед обследованием допустимо выпить воду с сахаром.
- При приеме препаратов, разжижающих кровь, нужно предупредить об этом врача эндоскописта до исследования.



Противопоказания к проведению анестезии

- Наличие декомпенсированных болезней сердечно-сосудистой системы, свежий (до 6 мес.) инсульт или инфаркт
- Наличие декомпенсированной патологии дыхательной системы (дыхательная недостаточность 3 ст.).
- Аллергия на пропофол



Противопоказания к проведению ВФГДС

- Гипертоническая болезнь (III ст. - прямое противопоказание к проведению ФГДС в амбулаторных условиях)
- Сужение пищевода из-за новообразований и в силу физиологических причин

- Сужение отделов желудка
- Признаки непроходимости кишечника
- Сильное желудочное кровотечение
- Психические заболевания в стадии обострения
- Выпячивание стенок пищевода
- Аневризма аорты
- Инфаркт миокарда
- Инсульт
- Нарушения в работе сердца (не купированные)
- Сразу после гипертонического криза
- Бронхиальная астма в обострении
- Сильный рвотный рефлекс
- Увеличенная щитовидная железа
- Заболевания верхних дыхательных путей в тяжелой форме
- Нарушение свертываемости крови
- Простудные заболевания, когда проведение процедуры невозможно (заложенность носа, кашель, отек гортани, высокая температура)
- Беременность во II и III триместрах

Список абсолютных противопоказаний к ФКС включает:

- Сердечно-сосудистая, легочная или смешанная недостаточность тяжелой степени при ИБС и пороках сердца в стадии декомпенсации
- Нарушение ритма сердечной деятельности

Перечень относительных противопоказаний к ФКС

- Острые воспалительные заболевания аноректальной области (например, обострение геморроя, анальные трещины, парапроктит и т.д.)
- Восстановление после хирургического вмешательства на органах малого таза и брюшной полости
- Гидроперикард, гидроторакс
- Геморрагические васкулиты

- Напряженный асцит
- Тяжелые нарушения свертываемости крови
- Беременность во II и III триместрах

При наличии у Вас перечисленных заболеваний или состояний, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сообщите о них врачу-эндоскописту до начала проведения исследования.



Предварительное обследование перед проведением ФКС с анестезией

До 39 лет

Обследование перед проведением анестезии не требуется

40–59 лет

Наличие электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой давностью не более 14 дней

После 60 лет

- 1 Наличие результатов анализа крови на гемоглобин и гематокрит (эритроциты и тромбоциты) давностью не более 1 месяца
- 2 Анализ крови на глюкозу и креатинин (давностью не более 1 месяц)
- 3 Рентгенография легких (давностью не более 1 года)
- 4 Наличие электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой давностью не более 14 дней.
- 5 Заключение по результатам консультации врача терапевта

Без предъявления результатов исследований врач анестезиолог-реаниматолог не проводит медикаментозную седацию!

Окончательное решение о возможности проведения ФКС с анестезией принимает врач анестезиолог-реаниматолог по результатам консультации непосредственно перед проведением исследования.

При наличии медицинских справок, выписок и данных предыдущих исследований обязательно возьмите их с собой.

При процедуре с медикаментозной седацией (анестезией) в течение 2 часов после процедуры категорически запрещается управлять автомобилем.